

syndrome de sevrage néonatal

Le syndrome de sevrage néonatal survient parce qu'une femme enceinte prend des drogues illicites ou sur ordonnance tels que:

Les amphétamines

Les barbituriques

La cocaïne

Diazepam

Marijuana

Les opiacés (héroïne, méthadone, la codéine)

Ces et d'autres drogues passent à travers le placenta - l'organe qui relie le bébé à sa mère dans l'utérus - et d'atteindre le bébé. Le bébé devient accro avec la mère.

À la naissance, le bébé est toujours dépendant de la drogue. Parce que le bébé n'est plus obtenir le médicament après la naissance, les symptômes de sevrage apparaissent.

La consommation d'alcool pendant la grossesse peut aussi causer des problèmes chez le bébé. Voir:
Syndrome d'alcoolisation fœtale

Symptômes

Les symptômes de syndrome de sevrage néonatal dépend:

Le type de drogue utilisée par la mère

Combien de la drogue qu'elle prenait

Pendant combien de temps elle a utilisé le médicament

Si le bébé est né à terme ou au début (prématurée)

Les symptômes peuvent commencer dans les 1-3 jours après la naissance, ou elles peuvent prendre de 5 à 10 jours pour comparaître. Ils peuvent inclure:

coloration de la peau tachetée (marbrures)

La diarrhée

Les pleurs excessifs ou les pleurs aigus

sucer excessive

Fièvre

réflexes hyperactifs

Augmentation du tonus musculaire

Irritabilité

Une mauvaise alimentation

Respiration rapide

Saisies

Les problèmes de sommeil

gain de poids lent

Nez bouché, éternuements

Transpiration

Tremble (tremblements)

Vomissements

Examens et tests

Il est important d'avoir votre bébé vérifié par un pédiatre. Beaucoup d'autres conditions peuvent produire les mêmes symptômes que le syndrome de sevrage néonatal.

Le médecin posera des questions sur l'usage de drogues de la mère, tels que les médicaments qu'elle a pris pendant la grossesse, et quand elle a été le dernier a pris.

Les tests qui peuvent être effectués pour diagnostiquer le retrait dans un nouveau-né sont:

syndrome de sevrage néonatal système de notation, qui attribue des points en fonction de chaque symptôme et sa gravité. Le score de l'enfant peut aider à déterminer le traitement.

écran de toxicologie de selles premier (méconium)

Test d'urine (ECBU)

Traitement

Le traitement dépend de la santé globale de l'enfant et si le bébé est né à terme ou prématurés.

L'équipe de soins de santé montre le nouveau-né attentivement les signes de sevrage, des problèmes d'alimentation, et le gain de poids. Les bébés qui vomissent ou qui sont très déshydratés pouvez avoir besoin de fluides dans une veine (voie intraveineuse).

Certains bébés ont besoin de médicaments pour traiter les symptômes de sevrage. Les médicaments peuvent inclure:

Benzodiazépines pour le sevrage alcoolique

La méthadone à l'héroïne et autres opiacés

Le médecin peut prescrire un médicament de l'enfant semblable à celle utilisée par la mère pendant la grossesse et diminuer lentement la dose au cours du temps. Cela permet de sevrer le bébé hors de la drogue et de soulager certains symptômes de sevrage.

Les nourrissons atteints du syndrome de sevrage néonatal sont souvent tatillon et difficile à calmer. Conseils pour calmer l'enfant sont notamment:

Doucement l'enfant à bascule

Réduire le bruit et les lumières

Swaddling le bébé dans une couverture

Les bébés atteints de cette affection ont souvent une mauvaise alimentation. Ces bébés peuvent avoir besoin:

Une formule plus riches en calories qui offre une meilleure nutrition

Les petites portions donné plus souvent

pronostic

Le traitement aide à soulager les symptômes de sevrage. Comment bien le bébé ne dépend en partie de

savoir si la mère (et père) continue de consommer des drogues.

Les complications possibles

L'exposition à la drogue dans l'utérus peuvent mener à plusieurs problèmes de santé, y compris:

Les malformations congénitales

Faible poids de naissance

La naissance prématurée

circonférence de la tête des petites

La mort subite du nourrisson (SMSN)

syndrome de sevrage néonatal peut durer de 1 semaine à 6 mois.

Quand communiquer avec un professionnel médical

Contactez votre fournisseur de soins de santé si vous êtes enceinte et ont pris tout type de médicaments. Aussi appeler si votre bébé présente des symptômes de syndrome de sevrage néonatal.

Prévention

Vous pouvez éviter ce problème en évitant les médicaments pendant la grossesse. Discutez de toutes les drogues avec votre fournisseur de soins de santé. Si vous consommez des drogues, cesser de les utiliser avant de tomber enceinte ou dès que possible après vous découvrez que vous êtes enceinte.